

# GLP-1 ダイエット(内服・注射療法)同意書

## 適応

肥満、内臓脂肪の蓄積

## 治療法

- (1) 通院による注射(週 1 回)
- (2) 自己注射(週 1 回または 1 日 1 回、当クリニックスタッフがご指導いたします)
- (3) 毎日 1 日 1 回最初の食事・飲水の前にコップ約半分(約 120ml 以下)の水で内服  
※服用後少なくとも 30 分は飲んだり食べたり、他の薬を飲むことも避けてください
- (4) 初診時採血にて健康状態の確認をさせていただき、問題なければ 2 回目来院時に処方または注射の流れになります。(採血代 自費で¥5500 かかります)
- (5) 定期的な診察、検査が必要な場合があります  
※健康診断の結果をご持参いただき、健康状態に問題なければ初診時に処方・注射することも可能です

合併症・  
注意事項 消化器系副作用(悪心、下痢など)が現れることがありますが、中止により改善します。  
糖尿病治療中の患者さま、甲状腺疾患、膵臓疾患のある患者さま、治療薬の内容によっては、GLP-1 療法を受けられない場合がありますので、必ず申告してください。

※持病をお持ちの方は、必ず医師に申告くださいますよう、お願いいたします。

副作用として、胃部不快感・吐気、ごくまれに低血糖・急性膵炎の症状をきたす場合がございます。  
(低血糖症状⇒冷汗が出る、脈が速くなる、動悸がする、眠気、意識消失、手足の震えなど)

- ・そのため、GLP-1 ダイエット中は低血糖症状に備え、飴・チョコレートなどを常備するようお願いいたします。
- ・服用・注射後 異常を感じたときは直ちに中止し、当院にご来院ください。
- ・効果には個人差があることをご理解のください。

※初診時は初診料 ¥3300、再診時は再診料 ¥1100 がかります。

GLP-1 ダイエットの説明を理解し、注意事項を守ったうえで施術を受けることを同意いたします。

年 月 日

住所 :

電話番号 :