

氏名：

ダイエットピル同意書

ブドウ糖再吸収阻害薬

血中に含まれるブドウ糖を尿と一緒に体外に排出する SGLT2阻害薬という薬剤。

血中のブドウ糖は、腎臓で一度、濾(こ)された後、尿細管というところから再吸収されるのですが、その再吸収を阻害することによりブドウ糖を尿と一緒に排出します。

1日あたり約400キロカロリーのブドウ糖が排出され、ダイエット効果を発揮します。

ブドウ糖再吸収阻害薬

カナグル

■用法

1日1回 1錠 朝食直前

■副作用

低血糖症状(動悸、発汗、手足のふるえ、眠気、意識消失)、脱水症状、頻尿、膀胱炎、カンジダ性膣炎

■飲めない方

- 重い感染症にかかっている方
- 最近、手術をした方
- 手術の予定のある方
- 大きな怪我をしている方

※水分をいつもより多く摂取することを心掛けていただき、
こまめに排尿をお願いいたします。



※効果には個人差があることをご理解ください。脂肪は筋肉と比較すると、同じ重さでも体積が大きいため、体重の減少はごく緩やかになります。痩せたかどうかの判断は体重だけでなく、体脂肪率・サイズ等の変化も参考にして下さい

※初診時は初診料 ¥ 3300、再診時は再診料 ¥ 1100 がかかります。

以上の内容を理解し、注意事項を守ったうえで治療を行うことを同意いたします。

年 月 日

住所：

氏名：

電話番号：